

PROBLEM

DOSTĘPNOŚCI CHIRURGÓW NACZYNIOWYCH W POLSCE

ŻYCIĘ
TĘTNI
OTWARTYMI
NACZYNIAMI

 **0,89**
W POLSCE

 **2,66**
W ESTONII

 **2,65**
WE WŁOSZECH

Średnia liczba specjalistów przypadających na 100 tys. mieszkańców w poszczególnych krajach.

Źródło danych: Ostatnie dane Eurostatu (2013 r.) informujące o wskaźniku liczby chirurgów naczyniowych w wybranych krajach Unii Europejskiej na 100 tys.

195 DNI

Średni czas oczekiwania na wizytę w poradni chorób naczyniowych w Polsce.

Źródło danych: Chirurgia naczyniowa w Polsce, Zielona Księga, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łązarskiego w Warszawie, Warszawa 2016 r.

MOŻLIWE KONSEKWENCJE WYWOŁANE ZBYT DŁUGIM OCZEKIWANIEM NA WIZYTĘ:



Pogorszenie jakości życia



Rozwój choroby miażdżycowej



Zabieg chirurgiczny i ewentualna amputacja kończyny



Zadaniem kampanii jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na możliwe konsekwencje wywołane zbyt długim oczekiwaniem na wizytę u specjalisty oraz umożliwienie odbycia takiej wizyty w ramach mobilnej poradni.

CELE KAMPANII

- ✓ edukowanie społeczeństwa odnośnie profilaktyki chorób naczyniowych
- ✓ zachęcenie do systematycznych badań
- ✓ zwrócenie uwagi decydentów na konieczność zwiększenia środków przeznaczonych na profilaktykę i leczenie chorób naczyniowych

ŻYCIĘ
TĘTNI
OTWARTYMI
NACZYNIAMI




CHROMANIE PRZESTANKOWE

Jest jednym z objawów choroby tętnic obwodowych, wynikającym ze stopniowego zwyradniania się tętnic doprowadzających krew do kończyn dolnych.



U niektórych pacjentów objawem jest jedynie drętwienie stopy. Chromanie przestankowe bywa nazywane "chorobą wystaw sklepowych", ponieważ chorzy często zatrzymując się z powodu bólu oraz chcąc ukryć swój problem, udają, że oglądają wystawy.



OBJAWY:

Początkowo: lekki ból w łydce podczas chodzenie po płaskim terenie

Później: promieniowanie bólu do stopy, uda, biodra, a nawet pośladków

Dalsze objawy niedokrwienia: blada skóra, zimne palce lub cała stopa

Innym znaczącym problemem społecznym jest przewlekła niewydolność żylna (PNŻ). Wykazano, że w populacji polskiej objawy tej choroby występują u **47% kobiet** i **37% mężczyzn**. U podstaw PNŻ leży nadciśnienie żylnie, definiowane jako stan zaburzonego odpływu i zastojów żylnego u pacjenta w pozycji stojącej, wskutek refluksu, zwężenia lub niedrożności.

Źródło danych: Przewlekła choroba żylna – patofizjologia, obraz kliniczny i leczenie. Jolanta Neubauer-Geryk, Leszek Bieniaszewski Zakład Fizjologii Klinicznej, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

CZYNNIKI RYZYKA MIAŻDŻYCY



wysokie stężenie cholesterolu całkowitego i trójglicerydów




nadciśnienie tętnicze



zaburzenia krzepnięcia krwi

180 $\frac{\text{MG}}{\text{DL}}$

cukrzyca



ograniczona aktywność fizyczna



nadwaga i otyłość



palenie tytoniu



Szybka diagnostyka to szansa na efektywne leczenie



„Życie tętni otwartymi naczyniami”